专家共识

DOI: 10.19538/j.fk2017040114

宫血宁胶囊妇产科临床应用指导建议

陈 蓉 ', 贺丰杰², 李长忠³, 罗颂平⁴, 马 颖⁵, 齐 聪°, 任慕兰¹, 阮祥燕⁵, 王东梅°, 魏绍斌¹º, 谢梅青¹¹, 杨 清⁵, 杨 欣¹², 郁 琦 ', 张治芬³, 周红林⁴, 朱 玲⁴

关键词: 宫血宁胶囊; 妇产科; 应用; 异常子宫出血

Keywords: Gongxuening capsules; department of obstetrics and gynecology; application; abnormal uterine bleeding

中图分类号: R71 文献标志码: C

出血性和炎症性疾病是妇产科常见两大病症,患病率高,病程迁延,容易反复发作,严重影响广大妇女身心健康。尤其出血性疾病病因复杂,临床上需要综合患者病情、妇科检查及相关辅助检查做出相应诊断,并针对不同的病因给予手术或药物治疗。中医药在治疗这两大疾病中发挥着重要的作用。宫血宁胶囊是常用的妇科止血药物,为了更好地规范其在妇产科的临床应用,并掌握其适应证,特制订本指导建议。

1 宫血宁胶囊简介

1.1 来源及成分 宫血宁胶囊是采用膜分离技术 按照现代植物药标准经乙醇提取百合科植物云南 重楼的干燥根茎部位精制而成的妇科中成药, 其 有效成分明确为: 薯蓣皂苷和偏诺皂苷 [1], 每粒中 含重楼皂苷 VI 不得少于 0.52 mg。

1.2 功效与适应证 凉血止血,清热除湿,化瘀止痛。用于崩漏下血,月经过多,产后或流产后宫缩不良出血及子宫功能性出血属血热妄行证者,以

作者单位: 1. 中国医学科学院 北京协和医院妇产科,北京 100730; 2. 陕西中医药大学附属医院,陕西 咸阳 712000; 3. 山东大学附属省立医院,山东 济南 250021; 4. 广州中医药大学第一附属医院,广东广州 510405; 5. 中国医科大学附属盛京医院,辽宁 沈阳 110004; 6. 上海中医药大学附属曙光医院,上海200021; 7. 东南大学附属中大医院,江苏 南京 210009; 8. 首都医科大学附属北京妇产医院,北京 100026; 9. 山东中医药大学附属医院,山东 济南 250011; 10. 成都中医药大学附属医院,四川 成都 610072; 11. 中山大学孙逸仙纪念 医院,广东广州 510120; 12. 北京大学人民医院,北京 100044; 13. 杭州市妇产科医院,浙江 杭州 310008; 14. 昆明医科大学第二附属医院,云南昆明 650101

通讯作者:马颖, 电子信箱: mayl@sj-hospital.org

及盆腔炎性疾病后遗症(慢性盆腔炎)之湿热瘀结 所致的少腹痛、腰骶痛、带下增多。

1.3 作用机制

- 1.3.1 止血 动物实验表明宫血宁胶囊可通过刺激血小板数量的增加,同时增强血小板糖蛋白的表达从而促进血小板聚集,缩短出、凝血时间^[2]。
- 1.3.2 缩宫 动物实验表明宫血宁胶囊可通过调节子宫平滑肌细胞外钙内流,内钙动员而达到缩宫作用^[3]。
- 1.3.3 消炎 动物实验表明宫血宁胶囊可通过促进血管内皮细胞增殖,减少炎性物质渗出,增加抗炎细胞因子表达起到抑制炎症反应的作用 [4]。
- 1.4 用药方法 出血性疾病:每次1~2粒口服,每日3次,血止停药;盆腔炎性疾病后遗症:每次2粒口服,每日3次,4周1个疗程。

2 临床应用

- 2.1 异常子宫出血 (abnormal uterine bleeding, AUB) 在新的异常子宫出血指南中,采取 FIGO的 PALM-COEIN分类,采用了有结构性改变和无结构性改变的分类方式,其中无结构性改变的异常子宫出血患者以内分泌治疗为主,同时可以辅助止血药物。研究表明宫血宁胶囊具有一定的减少出血量的作用 [5],配合内分泌治疗可以控制出血量 [6] 及孕激素撤血量。对于病情较轻而且出血量少的患者,也可以考虑宫血宁止血治疗 [7]。对于有结构改变的异常子宫出血,可以口服宫血宁辅助止血。
- 2.2 产后子宫复旧不良、恶露不尽 宫血宁胶囊

既有止血作用又有缩宫作用,而且研究显示,宫血宁不通过乳汁代谢排泄,对婴儿无影响 [8],因此适用于产后促进子宫复旧 [9]。正常产褥期产妇于胎盘娩出 3 h后,口服宫血宁胶囊,能明显减少产妇子宫出血,防治产后恶露延长和不尽 [10],提高产妇康复速度。对于产后子宫复旧不良 [11]、恶露不尽 [12] 的患者,宫血宁胶囊因兼具止血、缩宫及抗炎三大功效,疗效确切。

2.3 宫内节育器 (IUD) 放置术后 宫内节育器因 安全、可逆而成为我国育龄女性最常用的长效避 孕措施,但由于 IUD 放置后常出现不规则阴道出血、月经过多、经期延长等现象影响了部分妇女的继续使用。研究显示,服用宫血宁胶囊 (2粒/次,3次/d,连服6d,以后每于月经来潮第1天开始服用,连服6d,共服3~6个月经周期) 能显著减少放置 IUD所致月经过多 [13-14],出血延长,减少贫血的发生率,从而可提高使用者的满意度和减少因症取出率。

此外,皮下埋植避孕剂后导致的异常子宫出血,也可服用宫血宁胶囊进行治疗[15]。

- 2.4 人工流产、药物流产后 研究显示,在人工流产术后服用宫血宁胶囊,能明显缩短阴道出血时间,减少阴道出血量 [16-17]。药物流产同时加服宫血宁胶囊 6粒每天分2~3次口服 9 d,不影响药物的完全流产率,同时可以减少药物流产术后出血量及出血时间,从而可能减少药流术后感染的机会 [8]。
- 2.5 盆腔炎性疾病后遗症 盆腔炎性疾病后遗症 是妇科常见病,易于反复,较难治愈,研究发现,在 常规治疗基础上,服用宫血宁胶囊对盆腔炎性疾 病后遗症所致的下腹部坠胀痛、腰骶酸痛、白带增 多等临床症状有显著疗效^[19]。

3 药物的安全性

- 3.1 不良反应 尚不明确。有文献报道偶见消化 道不适,一般减量或停药后可消失[18]。
- 3.2 禁忌 孕妇忌服。
- 3.3 注意事项 胃肠道疾病患者慎用或减量服用。

宫血宁胶囊药物成分明确,作用机制清楚,多中心临床研究和多年临床应用显示,其对妇产科出血性疾病及盆腔炎性疾病后遗症的治疗安全有

效, 临床上可以根据患者的病情酌情应用。

参考文献

- [1] 国家药典委员会.中华人民共和国药典 (2015年版一部) M]. 北京:中国医药科技出版社,2015:1303-1304.
- [2] 赵振虎,善亚君,柳晓兰,等. 皂甙提取物宫血宁止血作用机制的研究[J]. 中华名医论坛, 2004, 4 (7): 4-5.
- [3] 赵振虎,善亚军。皂甙提取物宫血宁缩宫作用与细胞内钙内流关系的研究[J].中国药物与临床,2005,5(6):415-417.
- [4] 李素燕,善亚君,赵振虎,等.宫血宁对小鼠骨髓细胞因子表达的影响[J].中药药理与临床,2006,22(3):53-55.
- [5] 潘卫平. 宫血宁胶囊治疗月经过多的疗效观察 [J]. 浙江中医药大学学报, 2008, 32 (2): 207-209.
- [6] 温燕逖,刘桂英,曹连文.宫血宁胶囊联合妈富隆治疗青春期功能失调性子宫出血疗效观察[J].实用中西医结合临床,2015,15(5):31-32.
- [7] 张莉,陈晓勇,陈小宁,等. 宫血宁胶囊治疗经期延长型青春期功血 [J]. 实用临床医学, 2007, 8 (6): 111-112.
- [8] 王英锋,罗立华,申严,等. HPLC-MS 法测定乳汁中宫血宁胶 囊主要有效成分重楼皂苷 [J] . 中国临床药理学杂志, 2003, 19 (5):370-372.
- [9] 胡贵玲. 宫血宁胶囊促进产后子宫复旧的临床观察 [J]. 中国 医药科学, 2012, 2 (18):75-76.
- [10] 杨晓艳、黄利红. 宫血宁对产后恶露影响的临床观察 [J]. 湖 北中医杂志, 2009, 31 (2):34-36.
- [11] 凌广晓,刘青.宫血宁治疗产后子宫复旧不全的临床观察[J].中国保健营养,2013,23 (7):3964.
- [12] 陈永梅. 宫血宁治疗剖宫产术后恶露延长的临床观察 [J]. 中医现代医生, 2008, 46 (12):100-101.
- [13] 张胜利,吴尚纯。宫血宁胶囊预防放置宫内节育器后子宫异常出血的效果[J].中国计划生育学杂志,2011,19 (4):202-205.
- [14] 范光升,庄留琪.宫血宁胶囊减少放置 IUD后阴道出血的有效性和安全性研究 [J].中国妇幼保健,2010,25 (36):5519-5520.
- [15] 程玉梅,韩丽晖,张亦心,等.宫血宁胶囊治疗使用长效皮下埋植避孕剂后阴道流血的临床研究[J].实用妇产科杂志,2009,25(7):418-420.
- [16] 胡护群. 宫血宁治疗人工流产术后阴道流血效果观察 [J]. 中国实用医药, 2007, 2 (13):120-121.
- [17] 范光升. 宫血宁胶囊预防药物流产后出血全国多中心临床研究总结 [J]. 中国实用妇科与产科杂志, 2007, 23 (6): 495-496.
- [18] 范光升,庄留琪. 宫血宁胶囊减少药物流产后阴道出血的有效性和安全性研究 [J] . 中国妇幼保健, 2010, 25 (35):5225-5226.
- [19] 王桂梅. 宫血宁胶囊治疗盆腔炎性疾病后遗症疗效观 察[J]. 北方药学, 2016, 13 (2):104-105.

(2016-12-01收稿)